



The miracles of science™

TALENDO®

Reg. No. L8116 Act No. 36 of 1947

Reg. Nr. L8116 Wet Nr. 36 van 1947

An emulsifiable concentrate systemic preventive and residual fungicide for the control of powdery mildew (*Uncinula necator* = *Oidium tuckeri*) in grapes and powdery mildew (*Erysiphe cichoracearum* and *Sphaerotheca fuliginea*) in Baby marrow, Courgette & Zucchini.

'n Emulgeerbare konsentraat sistemiese voorkomende en nawerkende swamdoder vir die beheer van poeieragtige meeldou (*Uncinula necator* = *Oidium tuckeri*) in wingerd en poeieragtige meeldou (*Erysiphe cichoracearum* en *Sphaerotheca fuliginea*) in Baby marrow, Courgette & Zucchini.

FUNGICIDE GROUP CODE

13

SWAMDODER GROEP KODE

ACTIVE INGREDIENT

Proquinazid (Quinazolinone)

200 g/l

AKTIEWE BESTANDDEEL

Proquinazid (Quinazolinone)

Nett volume

250ml & 1l

Netto volume

**REGISTERED BY /
GEREGISTREER DEUR:**

DUPONT DE NEMOURS SOUTH AFRICA (Pty) Ltd
Co. Reg. No. 2009/014079/07
P. O. BOX / POSBUS 3332
HALFWAY HOUSE 1685
Tel: (011) 218 8600

**24 HOUR EMERGENCY
NUMBER / 24 UUR
NOODNUMMER
083 123 3911**

UN No. / VN Nr. 3077

BATCH NUMBER
DATE MANUFACTURED

LOTNOMMER
DATUM VERVAARDIG



**CAUTION
VERSIGTIG**



WAARSKUWINGS

- ONTHOUDINGSPERIODE: Minimum aantal dae tussen laaste toediening en oes:

Baby marrows/ Courgettes / Zucchini	3 dae*
Wyndruiwe	28 dae
Tafeldruiwe	28 dae

- 'n Erge oogirritant. Kan oë beskadig.
- Kan neus, keel en vel irriteer.
- Skadelik indien ingesluk, ingeasem of deur vel geabsorbeer word.
- Hou buite bereik van kinders, diere en oningeligte persone.
- Bêre apart van voedsel en voer.
- Uiters giftig vir vis en waterlewende organismes.
- HERBETREDING: Moet nie behandelde gebied betree alvorens die spuitneerslag droog is nie, tensy beskermende oorklere gedra word.

Alhoewel hierdie middel omvattend onder 'n groot verskeidenheid toestande getoets is waarborg die registrasiehouer nie dat dit onder alle toestande doeltreffend sal wees nie, aangesien die werking en effek daarvan beïnvloed kan word deur faktore soos abnormale, grond-, klimaats- en bergingstoestande; kwaliteit van verdunningswater; verenigbaarheid met ander stowwe wat nie op die etiket aangedui is nie en die voorkoms van weerstand van die siekte teen die betrokke middel sowel as die metode, tyd en akkuraatheid van toediening. Verder aanvaar die registrasiehouer nie verantwoordelikheid vir skade aan gewasse, plantegroei, en omgewing of vir nadelige effek op mens of dier of vir 'n gebrek aan prestasie van die betrokke middel as gevolg van die ontstaan van toestande wat nie kragtens die registrasie voorsien kon word nie. Raadpleeg die verskaffer in die geval van enige onsekerheid.

VOORSORGMAATREËLS

- Vermy oogkontak.
- Vermy kontak met vel en klere.
- Ingeval konsentraat in oë kom, was onmiddellik met volop water en kry mediese advies.
- In die geval van aanraking met vel, was met oormaat seep en water.
- Moet nie eet, rook of drink terwyl die produk gemeng of toegedien word nie of voordat die gesig en hande nie gewas is nie.
- Moet nie die spuitnewel inasem nie.
- Vir die beskerming van werkers tydens vermenging, hantering en toediening, dra beskermende klerasie, 'n beskermende bril of gesigskerm en rubberhandskoene.
- Was altyd met seep en water na gebruik en na toevallige velkontak.
- Was besmette klere na gebruik.
- Verhoed besoedeling van voedsel, voer, eetgerei en drinkwater.
- Was toedieningsapparaat uit met skoon water na gebruik en voordat dit vir ander middels gebruik word. Verhoed besoedeling van waterbronne, weiding en ander gewasse tydens skoonmaak van apparaat of met waswater.
- Voorkom spuitnewelwegdrywing na waterbronne, weiding en gewasse wat nie behandel word nie.
- Moet nie toedien binne 14 meter van waterbronne nie.
- Spoel die leë houer driekeer as volg uit: Keer die leë houer om oor spuit- of mengtenk en dreineer vir 30 sekondes na die vloei tot 'n gedrup verminder het. Spoel daarna die leë houer minstens drie keer uit met 'n volume water gelykstaande aan 'n minimum van 10 % van die inhoud van die houer en voeg by die inhoud van die spuittenk.
- Vernietig die leë houer deur gate in te kap en plat te druk en moet dit vir geen ander doel gebruik nie.

WEERSTANDSWAARSKUWING

- **TALENDO®** is 'n groepkode U7 swamdoder. Kruisweerstand tussen **TALENDO®** en groepkode 13 swamdoders in sommige swamspesies [bv. *Erysiphe (Uncinula) necator*] is bewys. Enige populasie van 'n spesifieke swam mag individue insluit wat 'n natuurlike

weerstand teen **TALENDO**[®], of enige ander groepkode U7 swamdoder het. Indien hierdie swamdoders herhaaldelik aangewend word, kan die weerstandbiedende individue uiteindelik die swampopulasie oorheers. Hierdie weerstandbiedende swamme sal waarskynlik nie deur **TALENDO**[®] of enige ander groepkode U7 of groepkode 13 swamdoders beheer word nie.

Om weerstand teen swamdoders te vertraag:

- Vermoed die eksklusiewe herhaaldelike gebruik van swamdoders met dieselfde groepkode. Wissel af met, of gebruik tenkmengsels van produkte in verskillende swamdoder groepkodes. Moet nie **TALENDO**[®] in spuitprogramme met groepkode 13 swamdoders, afwissel nie.
- Raadpleeg toepaslike individuele produketikette wanneer daar afgewissel word, of tenkmengsels gemaak word, met produkte in swamdodergroepkode M.
- Integreer ander beheermaatreëls (chemies, verbouing, biologies) in swamdoder programme.

Vir spesifieke inligting oor weerstandsbestuur kontak die registrasiehouer van hierdie produk.

GEBRUIKSAANWYSINGS:

GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

WERKSWYSE:

TALENDO[®] 200g/l EC bevat proquinazid, 'n nuwe quinazolinone swamdoder met 'n unieke werkswyse. Proquinazid werk **voorkomend** teen poeieragtige meeldou (skimmel) in druive en pampoengewasse deur spoorontkieming te inhibeer en het geen uitwissende werking op gevestigde besmettings nie.

WEERSTANDBESTUUR:

Daar word aanbeveel dat **TALENDO**[®] in a program met ander swamdoders teen poeieragtige meeldou (skimmel) gebruik word. **Die aantal TALENDO**[®] **toedienings moet beperk word tot 'n maksimum van drie toedienings per seisoen, waarvan nie meer as twee toedienings opeenvolgend met TALENDO**[®] **in druive en pampoengewasse gemaak moet word nie.**

VERENIGBAARHEID:

TALENDO[®] is verenigbaar met Curzate[®] Pro (Reg. Nr. L5698 Wet Nr. 36 van 1947), Olymp[®] 100 EW (Reg. Nr. L6063 Wet Nr. 36 van 1947) en Dithane[®] M45 (Reg. Nr. L2914 Wet Nr. 36 van 1947) in tenkmengsels.

MENGINSTRUKSIES:

WINGERD EN PAMPOENGWASSE:

1. Maak spuittenk 1/4 - 1/2 vol met water.
2. Voeg die benodigde hoeveelheid **TALENDO**[®] direk in die spuittenk terwyl aanhoudend geroer word en die spuittenk tot die verlangde volume gevul word met water.

TOEDIENINGSHOEVEELHEDE:

GEWAS/SIEKTE	DOSIS / 100 ℓ WATER	OPMERKINGS
Baby marrow, Courgette & Zucchini: Poeieragtige meeldou (<i>Erysiphe cichoracearum</i> en <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	40 ml	Dien TALENDO [®] voorkomend in 'n spuitprogram elke 10-14 dae toe sodra siektesimptome verskyn. Dien 500-750 ℓ spuitmengsel per ha toe afhangende van gewasgrootte en -digtheid. Verseker egalige en deeglike bedekking van plante. Moet nie 'n maksimum van drie TALENDO [®] bespuitings per seisoen oorskry nie en moet nie meer as twee TALENDO [®] bespuitings opeenvolgend toedien nie. Laat 3 dae toe tussen laaste toediening en oes (Sien NOTAS hieronder) . NOTAS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebruik TALENDO[®] slegs op pampoengewasse wat vir lokale gebruik en nie vir uitvoer bestem is nie. 2. Gebruik TALENDO[®] slegs op pampoengewasse wat op oop landerye (nie in glashuise of plastiek tonnells nie) verbou word. 3. Lees ook die WEERSTANDWAAR-SKUWING op hierdie etiket.
TAFELDRUIWE: Poeieragtige meeldou (<i>Uncinula necator</i> = <i>Oidium tuckeri</i>)	25 ml	Dien TALENDO [®] in 'n 14 dae voorkomende spuitprogram vanaf 5-10 cm lootlengte tot 28 dae voor oes toe (NB: vir uitvoerdruie sien NOTA 1 hieronder) Aanbevole spuitvolumes per ha: <ol style="list-style-type: none"> 1. 5-10 cm lootlengte tot blom: 500-750 ℓ 2. Vanaf blom tot ertjekorrel grootte: 1000-1200 ℓ 3. Vanaf ertjekorrel grootte tot 28 dae voor oes: 1200-1500 ℓ. Verseker deeglike bedekking van trosse. Moet nie 'n maksimum van drie TALENDO [®] bespuitings per seisoen oorskry nie en moet nie meer as twee TALENDO [®] bespuitings opeenvolgend toedien nie. Laat 28 dae toe tussen laaste toediening en oes. NOTAS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Die voorgestelde onthoudingsperiode / aantal dae tussen laaste toediening en oes, voldoen aan lokale maksimum

		<p>residu limiet vereistes (MRL's) maar mag nie aan alle oorsese MRL's voldoen nie.</p> <p>2. Lees ook die WEERSTANDWAAR-SKUWING op hierdie etiket.</p>
<p>TAFELDRUIWE (vervolg): Poeieragtige meeldou (<i>Uncinula necator</i> = <i>Oidium tuckeri</i>)</p>	<p>20 mℓ TALENDO® plus 35 mℓ OLYMP® tenkmengsel</p>	<p>Dien die TALENDO® plus OLYMP® tenkmengsel in 'n 14 dae voorkomende spuitprogram vanaf 5-10 cm lootlengte tot 28 dae voor oes toe (NB: vir uitvoerdruive sien NOTA 1 hieronder)</p> <p>Aanbevole spuitvolumes per ha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5-10 cm lootlengte tot blom: 500-750 ℓ 2. Vanaf blom tot ertjekorrel grootte: 1000-1200 ℓ 3. Vanaf ertjekorrel grootte tot 28 dae voor oes: 1200-1500 ℓ. <p>Verseker deeglike bedekking van trosse.</p> <p>Moet nie 'n maksimum van twee TALENDO® bevattende bespuitings per seisoen oorskry nie en moet nie meer as twee TALENDO® bevattende bespuitings opeenvolgend toedien nie.</p> <p>Laat 28 dae toe tussen laaste toediening en oes.</p> <p>NOTAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die voorgestelde onthoudingsperiode / aantal dae tussen laaste toediening en oes, voldoen aan lokale maksimum residu limiet vereistes (MRL's) maar mag nie aan alle oorsese MRL's voldoen nie. 2. Lees ook die WEERSTANDWAAR-SKUWING op hierdie etiket.

